



2 番草の収穫・夏の乳房炎対策について

□2番草収穫について

2番草刈り取り時期の目安は、以下を参考にしてください。

主体草種	刈り取り時期（1番草刈り取り後）
チモシー	55日後
オーチャードグラス	45日後 ⇒ 3番草を収穫する場合、2番草収穫後速やかに追肥する
リードカナリーグラス	40日後

□夏の乳房炎対策

夏は、高温多湿の環境によるアシドーシス、免疫力低下といった牛の体調変化を引き金に、大腸菌性乳房炎などが発症しやすくなります。

暑熱対策、丁寧な搾乳作業、牛体衛生管理などを徹底し、乳房炎を防ぎましょう。

○暑熱対策

- ✓ 牛舎内の換気扇の稼働、寒冷紗の設置などで、牛の体感温度を下げる。
- ✓ 昼間放牧時に日陰のある放牧地の活用、夜間放牧のみの実施など、状況に応じて放牧方法を工夫する。
- ✓ いつでも水が飲めて、エサが食べられる環境を作る。夕方の給餌量を増やす。
- ✓ ミネラル、塩、重曹などを欠かさず給与する。

○搾乳作業・牛床環境整備

- ✓ 清拭は、乳頭をねじるようにして拭き、乳頭口の汚れをしっかりと拭き取る。
- ✓ ディッピングは、乳頭全体をムラなくドブ漬ける。
- ✓ こまめな除糞、敷料交換、石灰資材の利用により、牛床を乾燥させる。
- ✓ 繋ぎ牛舎では、牛床が汚れにくくなるよう、カウトレーナーの位置を調整する。

**農作業事故防止 ～ 過信しない。自分の技術、今の体力。
＝ 機械の点検・整備は、必ずエンジンを止めてから！ ＝**

■お問い合わせ

宗谷農業改良普及センター宗谷北部支所 TEL 0162-82-2119

宗谷農改
ホームページ
QRコードからGO!

